

# COVID-19 ИЛИ ГРИПП ?

## СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

### ГРИПП

### COVID-19

#### СИМПТОМЫ



**ЖАР**  
(ЧАСТО- ВНЕЗАПНОЕ  
НАЧАЛО)

ЖАР



**ГОЛОВНАЯ БОЛЬ**

УТОМЛЯЕМОСТЬ



**КАШЕЛЬ**

КАШЕЛЬ  
(ОБЫЧНО СУХОЙ)



**БОЛЬ В ГОРЛЕ**

ЧУВСТВО  
«ЗАЛОЖЕННОСТИ»  
В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ



**ОЗНОБ**

ОДЫШКА



**МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ**

ДИАРЕЯ, РВОТА  
(РЕДКО)



**В ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ СИМПТОМЫ  
МОГУТ СТАТЬ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ**

#### ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

##### РЕЖЕ

- МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПНЕВМОНИЯ
- ВОЗМОЖЕН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД



##### ЧАЩЕ

- ПНЕВМОНИЯ
- ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС СИНДРОМ
- СМЕРТЬ

# ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

**ЕСТЬ** ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБНЫЕ ОБЛЕГЧИТЬ СИМПТОМЫ, СОКРАТИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЗНИ



**НЕТ** ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ, НО ОНИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ



## ВАКЦИНА

ВАКЦИНА ДОСТУПНА ЭФФЕКТИВНО ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЛИ СНИЖАЕТ ТЯЖЕСТЬ ГРИППА



ВАКЦИНА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ



## ПРОФИЛАКТИКА



ЧАСТОЕ, ТЩАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК



РЕСПИРАТОРНЫЙ ЭТИКЕТ



ПРЕБЫВАНИЕ ДОМА ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ



ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТАКТОВ С ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

## ДИАГНОСТИКА

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЛАБОРАТОРНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА ВИРУСА



ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА (ВЫЯВЛЕНИЕ РНК 2019-nCoV МЕТОДОМ ПЦР)